

# ES AXANA

COLZA DE PRINTEMPS

COLZA 

## IDENTITÉ

- Inscription UE 2012.
- Type : Hybride Restauré.

## LES POINTS FORTS

- Productivité.
- Forte teneur en huile.
- Faible teneur en glucosinolates.
- Floraison précoce.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES de ES AXANA

- Résultats pluriannuels – Base de données EURALIS SEMENCES

	Productivité		Teneur en huile aux normes
ES AXANA	33,4 q/ha	113,20 %	48 %
Moyenne de la série	29,5 q/ha	100 %	47 %

## LES FACTEURS CLÉS DE RÉUSSITE ( SOURCE CETIOM )

### ■ LE SEMIS

- Semer tôt : dès que le sol atteint 6 à 8°C à 5 cm.  
À partir du moment où le sol est réchauffé, plus le semis est précoce, plus l'espérance de rendement est élevée.
- Semer dense : Viser 80 à 110 plantes au m<sup>2</sup>.  
Le colza de printemps ne ramifie pas comme le colza d'hiver, Aussi, il est nécessaire de semer beaucoup plus dense.  
En pratique, la dose de semis est voisine de 5 kg / ha pour viser 80 à 100 plantes au m<sup>2</sup> .  
Utiliser un semoir à céréales à 17 cm d'écartement en raison des fortes densités. Semer à 2 cm de profondeur.
- Un travail profond n'est pas indispensable mais un sol bien structuré est impératif pour obtenir un enracinement profond.

Dates de semis et de récolte par région

Régions	Semis	Récolte
Nord-Est	Du 10 au 30 Mars	De fin Août à début Septemb
Nord-Picardie	Du 1er au 20 Mars	Début Septembre
Bretagne-Normandie	Du 1er au 20 Mars	De mi-Août à début Septemb
Centre	Du 1er au 20 Mars	De fin Août à début Septemb
Ouest-Atlantique	Du 1er au 20 Mars	Début Août
Sud	Du 20 Février au 10 Mars	Mi-Juillet

### ■ LES INTERVENTIONS CULTURALES

- Protection contre les insectes :  
Les insectes sont à surveiller à l'aide d'un piège. La décision d'intervention doit ensuite prendre en compte le stade de sensibilité du colza de printemps et le seuil de traitement. Être particulièrement vigilants sur la protection contre les méligèthes.
- Protection contre les maladies :  
Toutes les maladies classiques du colza d'hiver peuvent toucher le colza de printemps.  
L'oïdium et l'alternaria sont à surveiller particulièrement.
- Désherbage :  
Le colza de printemps a un développement végétatif rapide, d'autant plus qu'il est semé en sol suffisamment réchauffé. Ainsi, il est capable d'étouffer les mauvaises herbes. Cette capacité est optimale pour des semis à écartement de 17 cm qui permettent une couverture rapide. Le désherbage chimique a un intérêt en cas de fortes infestations d'adventices nuisibles : folle avoine, vulpin, matricaire, gaillet et sanves.

### ■ L'ALIMENTATION EN EAU

Le potentiel génétique des variétés supérieur à 30 q ne s'exprime que dans les sols à réserve hydrique suffisante ou dans les régions à pluviométrie printanière suffisante. Les terres séchantes sont donc à éviter.

Pour des conseils plus complets, se référer à la fiche CETIOM – Colza de printemps (Mars 2002).

